

**ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ**

1. Δοκιμασία κόπωσης:

- Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου χωρίς γνωστή λειτουργική ικανότητα (πιθανώς καρδιοπνευμονική δοκιμασία κόπωσης σε υψηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση) εφόσον αναμένεται να επηρεάσει το χειρισμό των ασθενών

2. Διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (ΤΤΕ):

- Σε ασθενείς με δύσπνοια άγνωστης αιτιολογίας

- Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με επιδεινούμενη δύσπνοια ή άλλη μεταβολή στην κλινική κατάσταση αν δεν έχει γίνει τους τελευταίους 12 μήνες

- Σε υποψία ή σε παρουσία γνωστής σοβαρής βαλβιδοπάθειας

- Σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση

3. Φαρμακολογική δυναμική δοκιμασία (dobutamine stress echo ή εναλλακτικά pharmacological MPI):

- Σε ασθενείς με ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση, ≥ 1 κλινικούς παράγοντες κινδύνου και πτωχή λειτουργική ικανότητα (< 4 METs)

4. Στεφανιογραφία:

- Ενδείξεις εκλεκτικής στεφανιογραφίας ως επί μη χειρουργικής κατάστασης

- Επείγουσα στεφανιογραφία σε ασθενείς με οξύ STEMI, που απαιτούν μη- επείγουσα μη- καρδιακή εγχείρηση

- Επείγουσα ή πρώιμη στεφανιογραφία σε ασθενείς με οξύ NSTEMI, που απαιτούν μη- επείγουσα μη- καρδιακή εγχείρηση

- Επείγουσα ή πρώιμη στεφανιογραφία Επείγουσα ή πρώιμη στεφανιογραφία σε ασθενείς με οξύ NSTEMI, που απαιτούν μη- επείγουσα μη- καρδιακή εγχείρηση

- Σε ασθενείς με αποδεδειγμένη ισχαιμία μυοκαρδίου και μη υποχωρούντα με ικανοποιητική φαρμακευτική αγωγή θωρακικό άλγος, που απαιτούν μη- επείγουσα μη- καρδιακή εγχείρηση

- Πιθανώς σε σταθερούς ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μη επείγουσα καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή

Βιβλιογραφία:

1. Kristensen S, et al. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management. *Eur Heart J* 2014; 35: 2383– 2431.
2. Fleisher L, et al. 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac Surgery: Executive Summary *Circulation* 2014; xx: xxx- xxx.